

## Zaai- en beheeradvies bufferstrookmengsel

Bufferstrookmengsel (meerjarig) Bijenlandschap Akkerbouw standaard

Ook toegestaan op biologische bedrijven

Zaaihoeveelheid: 12,5 kg/ha  
 Zaaitijd: 2e helft april t/m 20 sept (risico uitvriezen van boekweit)  
 Zaaidiepte: 1-2 cm  
 Bemesting: Niet of zeer beperkt (max 25 kg N)

Toelichting mengsel: Het mengsel bestaat hoofdzakelijk uit meerjarige kruiden die zeer geschikt zijn voor hommels en bijen. De boekweit en rode klaver zijn belangrijk voor de onkruidonderdrukking.

%	Soort
6%	duizendblad
4%	wilde peen
16%	rode klaver mattenklee bio
2%	beemdkroon
2%	knoopkruid
6%	hopklaver
3%	klaproos wildtype
3%	margriet wildtype
2%	gewone brunel
6%	smalle weegbree wildtype
2%	wilde marjolein
48%	boekweit bio

### Adviezen bij inzaai:

Het mengsel bestaat grotendeels uit traaggroeiende soorten waardoor het risico op veronkruiding reëel is. Voorkom veronkruiding door het aanleggen van een vals zaaibed. Leg een zaaibed klaar en bewerk dit meerdere malen (heel) oppervlakkig alvorens te zaaien. Bewerken kan bijvoorbeeld met wiedege of zaaibedcombinatie. Om veronkruiding te voorkomen is zaaien op schoffelafstand sterk aan te bevelen. Dit kan bijvoorbeeld door een aantal pijpen of zaaischijven van de zaaimachine dicht te zetten. Of door pijpen van een (bijvoorbeeld) APV of granulaatstrooier uit te laten monden in het zaaielement van bijvoorbeeld een bietenzaaimachine.

### Adviezen voor beheer:

- Geef de soorten in het mengsel ruim de tijd in bloei te komen ten gunste van insecten en vogels
- Pleksgewijs eventueel ongewenste soorten uitmaaien
- Het mengsel is bestand tegen incidenteel berijden
- Maai het mengsel altijd aan het eind van de zomer (sept-okt) en voer het maaisel af